

ভারটিমেক ০১৮ ইসি

“ভারটিমেকঃ সবজী চাষে মাকড় থেকে টেনশন মুক্ত”

- মূল উপাদান : এবামেকটিন (প্রতি লিটার ভারটিমেক -এ ১৮ গ্রাম এবামেকটিন আছে)
- ফরমুলেশন : ইমালসিফায়াবল কস্পেঞ্চার (ইসি - পানিতে মিশালে সাদা হয়)
- প্যাক সাইজ : ৫০ এমএল, ১০০ এমএল ও ৫০০ এমএল
- বাহ্যিক অবস্থা : তরল
- রং : হলুদ থেকে হালকা লাল বাদামী
- কার্যক্ষমতা : স্পর্শক, পাকস্থলী ও ট্রান্স-ল্যামিনার ক্ষমতাসম্পন্ন
- পন্যের উৎস (দেশ) : সুইজ্যারল্যান্ড

□ যে ভাবে কাজ করে

- ✧ স্পর্শক, পাকস্থলী ও স্থানীয়ভাবে অনুপ্রবেশ ক্ষমতাসম্পন্ন।
- ✧ ত্বকের উপরের স্তর দিয়ে ভারটিমেক চলাচল করতে পারে।
- ✧ স্নায়ুতন্ত্রের উপর কার্যকরী - স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা ও স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।
- ✧ ১ ঘন্টার মধ্যে পোকাকার কর্মক্ষমতা লোপ পায়।
- ✧ পোকাকার শরীর অবশ্য হয়ে যায় এবং খাদ্য গ্রহণে অনিহা সৃষ্টির কারণে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ফলে পোকা মারা যায়।

□ উপকারিতা

- ✧ স্প্রে করার পরপরই গাছের ভিতর দ্রুত ঢুকে যায় এবং পাতার ভিতর আধার হিসাবে ভারটিমেক অবস্থান করে।
- ✧ অল্প সময়ের মধ্যেই পোকা খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীতে পোকা মারা যায়।
- ✧ স্থানীয়ভাবে অনুপ্রবেশযোগ্য হওয়ার হালকা বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় না।
- ✧ চকচকে উজ্জ্বল পুষ্ট ফসল ফ্রেতার পছন্দ এবং অধিক বাজার মূল্য নিশ্চিত করে।

□ ব্যবহারবিধি

শস্য	পোকা	মাত্রা ও প্রয়োগবিধি
বেগুন	মাকড়	২৪০ এমএল/একর। প্রতি লিটার পানিতে ১.২ এমএল হারে ভারটিমেক মিশিয়ে পাতার উভয় পিঠ ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন। একই নিয়মে ৭ দিন পর পর স্প্রে অব্যাহত রাখুন।
চা	মাকড়	৫০৬ এমএল/একর। প্রতি লিটার পানিতে ১.২৫ এমএল হারে ভারটিমেক মিশিয়ে পাতার উভয় পিঠ ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন। একই নিয়মে ৭ দিন পর পর স্প্রে অব্যাহত রাখুন।

Krishitey Syngenta